
Informasi Obat

Produk Baru : Reotal

Nama dagang : Reotal

Bahan aktif : Pentoksifilin

Bentuk sediaan :

- Dragee 100mg (Box isi 10 X 10's)
- Ampul 100 mg/5 cc (Box isi 10 amp)

INDIKASI

1. Penderita *claudicatio intermittens* karena penyumbatan pembuluh darah yang kronis pada tungkai.
2. Penyakit-penyakit pembuluh darah perifer yang lain.

KONTRA INDIKASI

1. Hipersensitif terhadap Pentoksifilin atau golongan metilxantines yang lain seperti kafein, teofilin dan teobromin.
2. Miokard infark yang baru.
3. Perdarahan hebat.
4. Sklerosis arteri koronaria dan serebral dengan hipertensi dan aritmia adalah kontraindikasi relatif untuk pengobatan parenteral.
5. Hindari pemakaian pada kehamilan.

EFEK SAMPING

Pada umumnya ditoleransi dengan baik. Gejala-gejala pada umumnya ringan, meliputi mual, malaise, rasa tidak enak pada lambung, vertigo dan *flushing*. Bila pemberian per oral menyebabkan gangguan pada lambung, sebaiknya diberikan setelah

makan. Dilaporkan juga reaksi hipersensitif seperti pruritus, kemerahan kulit, urtikaria dan angioneurotik udem.

DOSIS DAN CARA PEMAKAIAN

1. Infus

- *Pemberian infus i. v.*

Dosis awal 100 mg (1 ampul) dalam 250 – 500 ml larutan infus (0,9% sodium klorida, 5% fruktosa atau glukosa) diberikan dalam 90 – 180 menit. Dosis dapat ditingkatkan dengan 50 mg perhari sampai dosis harian maksimum sebesar 400 mg.

- *Infus intra arteri:*

100– 300mg (1 – 3 ampul) perhari dalam 20–50 ml dari 0,9% sodium klorida diberikan dalam 10– 30 menit. (10 menit per 100 mg Reotal).

2. Injeksi

Dosis 100mg (1 ampul) secara i.v atau intra arterial perhari. Injeksi harus diberikan secara lambat (paling lambat 5 menit) dan pasien harus berbaring. Dianjurkan memberikan dosis awal 50 mg yang dilarutkan dalam 5 ml 0,9% sodium klorida.

3. Oral

Dosis awal : 200 mg s/d 400 mg tiga kali sehari.

Dosis pemeliharaan: 100 – 200 mg, 3 X sehari.



Man doth what he can, and God what he will