
Produk Baru

Kaltrofen[®] gel

Komposisi

Tiap gram gel mengandung ketoprofen 0,025 g.

Farmakologi

Ketoprofen merupakan anti-inflamasi non-steroid (AINS) dengan daya analgesik, anti inflamasi.

Hanya sebagian kecil ketoprofen diserap pada pemakaian topikal.

Indikasi

Trauma ringan, terutama yang disebabkan oleh cedera sewaktu berolah raga, terkilir, tendinitis, kontusio tendon dan otot, pembengkakan, dan nyeri pascatrauma.

Dosis dan Cara Pemakaian

Oleskan 2 - 3 kali sehari pada daerah yang nyeri atau meradang, lakukan pijatan lembut dan lama untuk menjamin penetrasi gel. Lama pemberian maksimal 7 hari. Sebaiknya tidak digunakan pada anak-anak karena belum terbukti keamanannya.

Kontraindikasi

- Hipersensitif terhadap AINS, pasien yang menderita atau mempunyai riwayat asma bronkial atau alergi.
- Infeksi kulit, eksem atau luka terbuka, dan dermatitis eksudatif.
- Ketoprofen *jelly* sebaiknya tidak digunakan pada pasien yang mempunyai reaksi alergi berupa asma, rinitis atau urtikaria yang disebabkan asetosal dan AINS yang lain.

Efek Samping

- Reaksi kulit seperti pruritus dan eritema lokal, terutama bila terpapar sinar matahari atau sinar ultraviolet. Sebaiknya penderita menghindari paparan sinar matahari selama pengobatan dengan **Kaltrofen[®] gel**.
- Pemakaian jangka panjang dapat menimbulkan reaksi

hipersensitif.

- Walaupun pada penggunaan topikal jarang terjadi, beberapa efek samping dilaporkan pada penggunaan sistemik; efek samping minor yang bersifat sementara, antara lain gangguan pencernaan seperti dispepsia, mual, konstipasi, diare, nyeri ulu hati dan beberapa gangguan pencernaan lainnya. Efek lain yang jarang terjadi antara lain nyeri kepala, pusing, bingung, vertigo, mengantuk, udem, perubahan emosi dan gangguan tidur. Efek samping utama yang jarang terjadi adalah: ulkus peptikum dan perdarahan. Reaksi hematologi termasuk trombositopeni, gangguan hati atau ginjal, reaksi pada kulit, bronkospasme dan reaksi anafilaksis sangat jarang terjadi.

Peringatan dan Perhatian

- Jangan digunakan pada selaput lendir atau mata.
- Hati-hati penggunaannya pada pasien dengan riwayat atau sedang mengalami perdarahan saluran cerna aktif, tukak lambung, penyakit radang pada saluran cerna atau gangguan ginjal berat meskipun efek sistemiknya minimal.
- Wanita hamil atau menyusui : **Kaltrofen[®] gel** sebaiknya tidak digunakan pada wanita hamil dan menyusui.
- Sebaiknya tidak digunakan pada anak-anak di bawah 12 tahun kecuali atas petunjuk dokter.
- Segera hentikan pemakaian jika terjadi kemerahan pada kulit setelah pemakaian.
- Seperti obat-obat AINS lainnya, ketoprofen tidak menyembuhkan penyakitnya.

Interaksi Obat

Belum pernah dilaporkan adanya interaksi antara **Kaltrofen[®] gel** dengan obat lain; namun dianjurkan untuk melakukan pengawasan pada pasien yang mendapat pengobatan kumarin.

Kemasan

Jelly : Tube 30 g, No. Reg. DKL 0111631828A1



Marketing Office:

PT. KALBE FARMA Tbk

Gedung Enseval, Jl. Letjend. Suprpto, Jakarta 10510

PO Box 3105 JAK, Jakarta – Indonesia

Tlp.: (021) 428 73888-89, Fax. : (021) 428 73680

Website : <http://www.kalbe.co.id>

Hotline service (bebas pulsa): 0-800-123-0-123, Senin – Jumat (07.00-15.30)