Ruang Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran

Dapatkah sejawat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ?

Jawablah B jika benar, S jika salah

Peranan Hubungan Ibu Anak pada Gagal Tumbuh Anak 0 – 36 bulan

Amal Yanis dkk.

1. Faktor jumlah anak yang terlalu banyak dapat menyebabkan gagal tumbuh organik.
2. Faktor hubungan ibu - anak dapat menyebabkan gagal tumbuh non organik.
3. Teori interaksi emosional ibu-anak pertama kali diuraikan oleh Bowlby.
4. Gagal tumbuh merupakan sindrom yang dapat dialami anak semua usia.
5. Gagal tumbuh non organik adalah jika tidak ditemukan faktor biomedik yang dapat dianggap sebagai penyebab.
6. Gagal tumbuh dapat meningkatkan risiko kematian anak.
7. Di antara faktor psikososial, faktor lingkungan merupakan faktor yang paling bermakna.
8. Pada penelitian ini, gagal tumbuh paling banyak dijumpai di kelompok usia 12-24 bulan.
9. Angka keterlambatan perkembangan balita di puskesmas karena minimnya stimulasi dini sekitar 30%.
10. Pada penelitian ini gagal tumbuh paling banyak dijumpai pada anak ke empat.

Profil Penderita Tuberkulosis Anak di Puskesmas Darek

Adi Winasan

1. Pada kemoprolifaksis tbc anak, imunisasi BCG diberikan setelah pengobatan pencegahan INH selesai.
2. Uji tuberkulin dinayatakan positif jika indurasi > 5 mm pada anak dengan gizi baik.
3. Reaksi negatif palsu uji tuberkulin dapat terjadi jika ada penyakit penyerta.
4. Sediaan untuk biakan kuman tbc pada anak umumnya diambil dari dahak.
5. Pemeriksaan/deteksi kuman tbc yang mutakhir ialah dengan teknik PCR.
6. Deteksi dini tbc anak diawali dari riwayat kontak erat dengan penderita tbc paru BTA (+)
7. Rontgen paru dapat memastikan gambaran tbc paru.
8. Vaksinasi BCG dapat mencegah infeksi tbc pada anak.
9. Gejala gibbus dapat mengarah ke tbc ekstra paru.
10. Anak dengan batuk dan wheezing yang tidak responsif terhadap antibiotika umum harus dicurigai menderita tbc paru.