

DIAGLIME

Glimepiride

Affordable control with
Original quality

- **Mengontrol gula darah dengan cepat dan konstan**
- **Dapat dikombinasi dengan preparat lain**
- **Dosis praktis 1 x sehari**
- **Relatif aman**

Komposisi

Glimepiride

Indikasi

NIDDM yang tidak terkontrol secara adekuat hanya dengan diet, olahraga & penurunan berat badan

Dosis

Awal 1 mg/hari
Rentang dosis 1-4 mg/hari

Kontra Indikasi

Hipersensitif terhadap glimepiride atau golongan sulfanilurea lain. Ketoasidosis diabetes dengan atau tanpa koma, hamil & laktasi

Perhatian

Dibutuhkan perubahan terapi sementara dengan insulin pada kondisi tekanan tertentu, seperti trauma, pembedahan, infeksi dengan demam. Perlu penyesuaian dosis jika terdapat faktor risiko hipoglikemia

Efek samping

Muntah, nyeri saluran cerna, diare, hipoglikemia, Kerusakan fungsi hati. Reaksi alergi pada kulit. Leukopenia, agranulositosis, trombositopenia. Hiponatremia, Gangguan akomodasi dan atau pandangan kabur.

Interaksi Obat

Dengan insulin & oral antidiabetik lain, penghambat ACE, allopurinol, steroid anabolic & hormon seks pria, kloramfenikol, turunan kumarin siklofosamid, MAOI, mikonazol, para aminosalisilat, pentoksifilin (dosis tinggi parenteral), fenilbutazon, probenecid, golongan kuinolon, salisilat, sulfonamid, tetrasiklin dapat menimbulkan hipoglikemia, Dengan acetazolamid, barbiturat, kortikosteroid, diuretic, epinefrin dapat meningkatkan kadar gula darah. Antagonis reseptor H2, klonidin & reserpin dapat mempotensiasi kadar gula darah. Beta bloker dapat menurunkan atau meningkatkan efek kumarin.

Sediaan Kemasan

- Diaglime 1 mg : kotak berisi 2 blister x 15 tablet
- Diaglime 2 mg : kotak berisi 2 blister x 15 tablet
- Diaglime 3 mg : kotak berisi 2 blister x 15 tablet
- Diaglime 4 mg : kotak berisi 2 blister x 15 tablet

