


glunor

M E T F O R M I N H C I



Handling Diabetes Without Stress

INDIKASI

Pengobatan awal untuk NIDDM dengan BB lebih atau normal & diet gagal. Terapi tunggal pada kegagalan sulfonilurea primer & sekunder. Terapi kombinasi dengan sulfonilurea. Terapi tambahan pada IDDM untuk menurunkan dosis insulin yang dibutuhkan.

DOSIS :

• Glunor 500mg

- Dosis awal dewasa : 2 kali sehari 1 tablet bersama dengan makanan.
Dosis maksimum : 2550 mg/hari terbagi dalam 3 dosis.
- Dosis anak : 2 kali sehari 1 tablet bersama dengan makanan.
Dosis maksimum : 2000 mg/hari terbagi dalam 3 dosis.

• Glunor 850mg

- Dosis awal dewasa : 1 kali sehari 1 tablet bersama dengan makanan.
Dosis maksimum : 2550 mg/hari terbagi dalam 3 dosis.

• Glunor XR 500mg

- Dosis awal : 1 kali sehari 1 tablet bersama dengan makan.
Dosis berikutnya harus disesuaikan dengan kebutuhan response terapeutik penderita.

KONTRA INDIKASI

DM dengan koma, ketoasidosis, kerusakan fungsi ginjal serius, penyakit hati kronik, gagal jantung, infark miokard, alkoholisme, penyakit kronik dan akut yang berhubungan dengan hipoksia jaringan, riwayat penyakit yang berhubungan dengan asidosis laktat, syok hipersensitivitas.

PERHATIAN

Fungsi ginjal yang kurang sempurna, onitor fungsi ginjal secara teratur, hamil dan menyusui.

Hentikan terapi 2-3 hari sebelum operasi. Kondisi yang menyebabkan dehidrasi, penderita dengan infeksi serius atau trauma.

EFEK SAMPING

Gangguan GI, asidosis laktat.

INTERAKSI OBAT

Sulfonilurea, insulin menyebabkan hipoglikemia. Alkohol mringkatkan resiko asidosis laktat. Absorpsi vit B12 terganggu. Perlu penyesuaian dosis antikoagulan. Simetidin menurunkan bersih ginjal.

SEDIAAN KEMASAN :

- Glunor 500mg box berisi 5 blister x 10 tablet salut selaput.
- Glunor 850mg box berisi 5 blister x 10 tablet salut selaput.
- Glunor XR 500mg box berisi 3 strip x 10 tablet salut selaput.



 **KALBE**
www.kalbe.co.id