


Irvasik®

IRBESARTAN 150 & 300 mg

Right Choice for Hypertension with Diabetic Nephropathy



EFEKTIFITAS IRBESARTAN PADA NEFROPATI DM¹⁾



Jumlah Pasien	Placebo	Irbesartan 150 mg	Irbesartan 300 mg
Prinsipal	201	201	184
Irbesartan 150 mg	199	195	187
Irbesartan 300 mg	194	194	186
	154	161	172
	139	148	159
	129	142	149
	36	43	49

Irbesartan bersifat renoprotektif dengan menghambat progresivitas menjadi nefropati diabetikum, pada pasien hipertensi dengan diabetes tipe 2 dan mikroalbuminuria persisten.

EFEK PENURUNAN BIOMARKER INFLAMASI PADA PASIEN DIABETES TIPE 2

	Irbesartan	Placebo	P
CRP (C-Reactive Protein) perubahan	↓ 6,4%	↑ 10%	< 0,001
Fibrinogen	↓ 0,069 g/L	↑ 0,069 g/L	0,027
IL-6 (Interleukin 6)	↑ 1,0%	↑ 6,6%	0,005

Irbesartan mengurangi inflamasi pada pasien diabetes tipe 2, dan dapat mengurangi risiko penyakit mikro dan makro vaskular.

Referensi :

- Parving H, Lahrmet H, Brochner-Mortensen, et al. The Effect of Irbesartan On The Development of Diabetic Nephropathy in Patients With Type 2 Diabetes. *N Eng J Med* 2001;345(12):861-9.
- Paragori G, Rosandi S, Harnid D, et al. Irbesartan Treatment Reduces Biomarkers of Inflammatory Activity in Patients With Type 2 Diabetes and Microalbuminuria. *Diabetes* 2008;57:550-5.

Komposisi :

Tiap kaplet IRVASK mengandung :
Irbesartan..... 150 mg
Irbesartan..... 300 mg

Indikasi :

IRVASK digunakan untuk pengobatan hipertensi.
IRVASK dapat diberikan sebagai terapi tunggal ataupun dikombinasikan dengan obat antihipertensi lain.

Dosis dan Cara Pemberian :

Dosis awal dan pemeliharaan irbesartan yang dianjurkan adalah 150 mg satu kali sehari.
Dosis dapat ditingkatkan sampai 300 mg satu kali sehari.
Irbesartan dapat diberikan sebelum atau sesudah makan.

Kontraindikasi :

- Irbesartan tidak boleh diberikan pada:
- Pasien yang hipersensitif terhadap irbesartan.
 - Kehamilan.
 - Ibu menyusui.

