



KALMECO®

Mecobalamin

small part Great IMPACT

Studi RCT Mecobalamin 1000 mcg 1x sehari selama 2 minggu dibandingkan dengan Plasebo untuk 60 pasien LBP (Low Back Pain) dengan VAS > 6. Parameter penilaian VAS (Visual Analog Score) & DQ (Disability Questionnaire)¹⁾



Basil studi menunjukkan adanya penurunan nilai VAS dan DQ secara bermakna pada pasien LBP yang diberikan suplementasi Mecobalamin dibandingkan dengan Plasebo

Meta-analisis dari rangkuman studi Vitamin B12 dan Co-enzim aktifnya untuk indikasi Diabetik Neuropati dari tahun 1954 – 2004 dengan hasil 7 studi memenuhi syarat meta-analisis dan 4 studi menggunakan Mecobalamin sebagai obat untuk intervensi²⁾

Studi	N	Indikasi	Intervensi	Hasil
Li, et al.	56	Neuropati DM	MTC vs PLB	MTC > PLB
Shindo, et al.	56	Neuropati DM	MTC vs PGE vs Diet	60% vs 90% vs 15%
Yaqub, et al.	56	Neuropati DM	MTC vs PLB	MTC > PLB
Devathanan, et al.	53	Neuropati DM	MTC vs PLB	MTC > PLB

Ket : MTC – methycobalamin 500 ug 3x sehari, PLB – Plasebo, PGE – Prostaglandin E1 1,2 ug/kg/hari



Referensi :

1. Letizia Mauro., G. et al. Eur Rev Med and Pharmacol Sci 2000;4:53-58.
2. Sun Yu., et al. Acta Neurol Taiwan 2005;14:48-54.

