


PARDOZ[®]

Levodopa + Benserazide



-  **Meningkatkan Levodopa yang dapat melewati sawar otak**
-  **Menurunkan fluktuasi motorik**

Tanpa Benserazide



Komposisi

Tiap tablet mengandung:

Levodopa.....100 mg
Benserazide HCl setara dengan Benserazide.....25 mg

Mekanisme kerja

Kombinasi Levodopa dan Benserazide:

- Meningkatkan Levodopa yang dapat melewati sawar otak
- Menurunkan fluktuasi motorik


Indikasi

Penyakit Parkinson dan gejala-gejala Parkinsonisme (contohnya pasca ensefalitis) kecuali sindrom Parkinson karena obat-obatan.

Dosis dan cara pemberian

- Dosis awal dapat diberikan 3 x 1 tablet/hari
- Dosis dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan individu
- Pada umumnya dosis diberikan 3 x 2 tablet/hari
- Penting untuk membagi dosis dalam 3 - 4 x/hari

Dengan Benserazide



Peringatan dan perhatian

Pengobatan dengan anti Parkinson lain sebaiknya jangan dihentikan secara mendadak pada saat pemberian PARDOZ[®] dimulai.

Pada penderita yang akan menjalani pembedahan dan memerlukan anestesi umum (selain pembedahan darurat), pemberian PARDOZ[®] hendaknya dihentikan 2 atau 3 hari sebelumnya. Jika pemberian PARDOZ[®] akan diteruskan kembali, mulai dengan dosis awal, kemudian dosis dapat dinaikkan secara bertahap sampai pada dosis sebelum pembedahan.

Efek samping

Efek samping yang paling sering terjadi terutama adalah anoreksia, mual dan muntah. Kelainan kardiovaskuler jarang terjadi.

Semua efek samping ini tergantung dari dosis yang diberikan dan dapat dihilangkan atau ditolelir bila dosis diturunkan.

Kontraindikasi

Pasien yang hipersensitif terhadap Levodopa dan Benserazide.

Pasien dengan glaukoma sudut sempit, psikosis dan keadaan lain dimana obat simpatomimetik golongan amin tidak dianjurkan, seperti kelainan endokrin, ginjal, hati, paru dan jantung.

Pasien dengan kelainan kulit yang tidak terdiagnosa dan melanoma malignum.

Pasien yang berumur di bawah 30 tahun.

Interaksi obat

- Memperkuat efek obat simpatomimetik seperti ephedrine, amphetamine, adrenalin dan isoproterenol
- Memperkuat efek obat antikolinergik
- Jika diberikan bersama obat antihipertensi dapat menyebabkan hipotensi postural
- Tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat golongan MAOI yang tidak spesifik maupun tipe A, karena dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya

Kemasan

PARDOZ[®], box berisi 5 strip @ 10 tablet

No. Reg. DKL0211635610A1



 **HEXPHARM JAYA**
A Kalbe Company

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi :

PT. Hexpharm Jaya
Institusi Line

Phone : (021) 461 - 0090

Fax. : (021) 468 - 20287

www.hexpharmjaya.com