


PIONIX®


Pioglitazone HCl

Give You *More* Glucose Control & Vascular Protection

Pemakaian pioglitazone pada pasien diabetes tipe 2 menurunkan risiko komplikasi makrovaskular (kematian, infark miokard non-fatal dan stroke).⁴



Gambar AUC dan Cmax hasil uji BA/BE Pionix versus Produk Referensi



Sumber: Data onfile PT Kalbe Farma Tbk.

- Melindungi vaskular
- Melindungi sel beta pankreas
- Melindungi pasien dari risiko hipoglikemia

KOMPOSISI

Tiap tablet mengandung :
 Pioglitazone hidroklorida 15 mg
 Pioglitazone hidroklorida 30 mg

INDIKASI

Pionix® diindikasikan sebagai terapi monoterapi, dan juga dapat diberikan bersamaan dengan sulfonilurea atau metformin bila dengan pemberian salah satu obat tersebut tidak memberikan kontrol gula darah yang baik.



DOSIS DAN CARA PEMBERIAN

Pionix® dapat diberikan dengan atau tanpa makanan. Dosis pada dewasa :

- Monoterapi:
Dosis awal 15 mg atau 30 mg, sekali sehari.
- Kombinasi dengan metformin
Kombinasi Pionix® dengan metformin dapat dimulai dengan dosis Pionix® 15 mg atau 30 mg sekali sehari, dengan melanjutkan dosis metformin yang sudah diberikan sebelumnya.
- Kombinasi dengan sulfonilurea
Kombinasi Pionix® dengan sulfonilurea dapat dimulai dengan dosis Pionix® 15 mg atau 30 mg sekali sehari, dengan melanjutkan dosis sulfonilurea yang sudah diberikan sebelumnya.

KEMASAN

Pionix® 15 mg : Dus isi 3 strip x 10 tablet No. Reg DKL 0904426510A1
 Pionix® 30 mg : Dus isi 3 strip x 10 tablet No. Reg DKL 0904426510B1

www.kalbe.co.id

KALBE